

	FORMATION SECOURISME INTERNE	Chapitre
	FICHE TECHNIQUE	Toxicologie
	Utilisation abusive de morphine	1/1

Signes

Etat de manque

Une personne peut être en état de manque si elle présente les symptômes suivants :

- mydriase
- Douleurs intenses surtout abdominales
- Tachycardie
- Hyperthermie
- Hypertension artérielle
- Angoisses
- Tremblements
- Nausées

Etat de surdosage

Une personne peut être en état de surdosage si elle présente les symptômes suivants :

- somnolence pouvant aller jusqu'au coma
- Bradycardie, hypotension
- Bradypepsie, cyanose, sueur
- Myosis très serrée très peu réactive
- Pause ventilatoire

Conduite à tenir

En présence d'un pareil cas, il est nécessaire de suivre la conduite suivante :

♦ Bilan

- Bilan neurologique (pupille, conscience). Bien stimuler la victime, surtout verbalement,
- Bilan ventilatoire (fréquence),
- Bilan circulatoire (fréquence, tension artérielle),
- Glycémie capillaire,
- Température.

♦ Technique

- PLS avec LVA,
- Oxygénation à 15 l/mn.

Risques d'évolution

- Possibilité d'évolution vers un oedème des poumons,
- Possibilité de Rhabdomyolise,
- Réveil brutal ☠,
- Arrêt cardio-ventilatoire par dépression respiratoire et apnée (surdosage),
- Etat de confusion,
- Convulsion.

Définitions

- Bradypnée : diminution du rythme ventilatoire de façon significative.
- Tachycardie : augmentation du rythme cardiaque de façon significative.
- Bradycardie : diminution du rythme cardiaque de façon significative.
- Myosis : rétrécissement anormal de la pupille de l'œil.
- Rhabdomyolise : phénomène de toxicité dû à un écrasement prolongé des muscles (type escarre).